

Xinomavro N

Origine : Grèce



Ampélographie



Feuille entière à sinus pétiolaire chevauchant. Nervures légèrement pigmentées. Limbe ondulé et parfois gaufré, bullé. Moyennement velue.



Grappes moyenne. moyennes, juteuses.

Baies



signe distinctif

Implantation

À planter de préférence sur terrains légers et à fertilité limitée

Très bonne résistance à la sécheresse



Adapté CC

Viti

Débourrement : 6j. avant Grenache

Maturité : 7j. après Grenache

Port demi-érigé ; cépage vigoureux

Sensible au mildiou

Sensible à l'oïdium

Autres sensibilités particulières : pourriture grise, carence en K

Potentiel de production élevé

Particularités : 3



tardif

Œno



Potentiel d'accumulation sucres moyen

Acidité très forte

Potentiel tannique moyen à fort

Cépage polyvalent permettant de produire différents types de vins, rosés légers ou rouges corsés en bonnes conditions de maturation. Cépage très tardif dont l'équilibre tannique dépend de la maturation. Couleur moyenne pouvant précipiter en bouteille.



Intéressant en rosé

Arômes :

épices
fruits rouges

Sources

Institut Rhodanien : <https://institut-rhodanien.com/>
Pl@ntgrape : <https://plantgrape.plantnet-project.org/>
IFV, CA84, CA30, CA26, Pierre Galet

Réalisation

Viviane Bécart
Romain Lacroix